

الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جمعية التحدي الخيرية  
لمكافحة الإيدز ومسبباته



برعاية اللجنة الشعبية للتعبئة طرابلس



المسابقة الأولى  
للتوعية و التثقيف الصحي  
حول مرض

الايوز

AIDS



جوائز قيمة للفائزين في المسابقة











Libyan Swiss  
Diagnostic Centre



المركز التشخيصي  
الليبي السويسري

المركز التشخيصي الليبي السويسري يقدم أفضل الخدمات الطبية  
المتميزة في مجال التشخيص لمعظم فروع الطب والعلاج



عيادة علاج الأسنان و عيادة تقويم الأسنان ، عيادة النساء و الولادة ، عيادة العقم  
، عيادة الأنف و الاذن و الحنجرة ، عيادة السمعيات ، عيادة المناظير ، عيادة  
الباطنية ، عيادة ضغوط القولون ، عيادة الأطفال ، عيادة الجراحة ، عيادة المسالك  
البولية و الكلى ، عيادة دراسة ضغوط المثانة ، عيادة جهاز تفتيت الحصى ، عيادة  
العظام ، عيادة الامراض الجلدية ، عيادة الطب العام ، عيادة العيون ، عيادة القلب  
، عيادة معمل القلب ، عيادة الامراض النفسية و العصبية بالاضافة إلى صالتي  
العمليات ( صغرى و كبرى ) خدمات الصيدلانية ، معمل تحليل متكامل ، قسم الأشعة  
بالمركز و الذى زود بأفضل المعدات التقنية ، كما يتوفر لدينا زيارات دورية لأطباء  
أخصائيين من المستشفى الجامعى بجنيف / سويسرا  
لاى أستفسار يرجى الاتصال بالمركز التشخيصي الليبي السويسري

بن عاشور - شارع الجرابية - طرابلس - ليبيا

هاتف 00218.21.3619693

3604104

3604105

00218.21.3619692

بريد مصور

Aids . الإيدز . Aids . الإيدز . Aids . الإيدز















### لاحظ ...

- قد يكون من الضروري نقل دم إلى شخص ما لأعراض طبية . فإذا كان المتبرع مصابا بعدوى فيروس العوز المناعي البشري فستكون هناك فرصة كبيرة لانتقال الفيروس إلى الشخص المنقول له الدم على أن معظم البلاد تقوم باختبار كل الدم المتبرع به للكشف عن وجود فيروس العوز المناعي البشري مما يقلل إلى أقصى حد فرص إنتقال العدوى من خلال نقل الدم .

- يحمل التقبيل العميق المترافق بالتعرض للعاب فرصة ضئيلة للغاية لنقل عدوى بفيروس العوز المناعي البشري ، وتكون فرصة نقل العدوى أكبر عند وجود جروح أو خدوش بالفم .

- يستحسن عدم المشاركة في فرش الأسنان ولو أن فرص نقل العدوى من خلالها قليلة .



### كيف لاتصاب بفيروس العوز المناعي البشري؟

- لا ينتقل فيروس العوز المناعي البشري من خلال الملامسة أو السعال أو العطس أو أدوات المائدة أو الأكواب أو الطعام أو أحواض السباحة أو المناشف أو مقاعد المراحيض أو الحيوانات الأليفة أو البعوض وغيره من الحشرات أو الحمامات .
- يدرّب أعضاء هيئات التمرّيز وغيرهم من العاملين في الخدمات الصحية الذين لهم اتصال مباشر بسوائل الجسم الخاصة بالمرضى على إتخاذ الإحتياطات اللازمة كجزء من الأعمال الروتينية في المستشفى .



### مامعنى ( الممارسة الجنسية المأمونة )

وما معنى ( الممارسة الجنسية المكفول لها أسباب الوقاية )

بسبب الخطر الذي يحمله فيروس العوز المناعي البشري والأمراض المنقولة جنسيا لأبد من توافر الوضوح التام فيما يتعلق بالممارسات الجنسية المعروف أنها تنطوي على خطر نقل العدوى بفيروس العوز المناعي البشري وتلك التي لا تنطوي علي نفس الخطر .

أ ( الممارسات الجنسية المأمونة ( لاحتمال للخطر ):

- ممارسة الأنشطة التالية ستمنع المنى أو سوائل المهبل أو الدم من قرينك أن يلامس دمك وبهذا تنقي الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري :  
الاستمنا ، التدليك ، الاحتكاك ، العناق ، ملامسة الأعضاء التناسلية .

ب ( الممارسات الجنسية قليلة الخطر :

- إن استعمال العازل الذكرى استعمالا صحيحا ومستمرا خلال الجماع ، يقلل خطر العدوى بفيروس العوز المناعي البشري والأمراض الأخرى المنقولة جنسيا .

لقد اعتبرت العوازل الذكرية المصنوعة من البلاستيك وقايات جيدة ضد العدوى بفيروس العوز المناعي البشري أو الأمراض المنقولة جنسيا وهي كذلك مانعة للحمل .

- إن الإستعمال غير الصحيح للعازل الذكرى يقلل من فاعليته ( حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلي تمزقه على سبيل المثال ) .

- الجماع باستعمال العازل يسمى ( الممارسة الجنسية المكفول لها أسباب الوقاية )

- الممارسات التالية تحتمل بعض الخطر ، إذ أن عددا ( ولو قليل ) من المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري انتقلت إليهم العدوى عن طريقها :

- تقبيل ولعق الأعضاء التناسلية والشرح .

- القبلات الجنسية العميقة المصحوبة بالتماس مع اللعاب .



ج ( الممارسات الجنسية غير المكفول لها أسباب الأمان :

- ممارسة الأنشطة التالية تحتمل خطرا مؤكداً :

- الجماع الشرجي بدون عازل ذكري .

- الجماع المهبلي بدون عازل ذكري .

- أى ممارسة جنسية تؤدي إلي النزف .

- التماس مع المنى أو الدم خلال ممارسة الجنس بالفم .





## هل الرجال والنساء متساوون في درجة التعرض الفيزيولوجي للعدوى بفيروس العوز المناعي البشري؟

النساء أكثر عرضة بقليل من الناحية الفيزيولوجية للعدوى بفيروس العوز المناعي البشري من الرجال ، لأن مساحة الغشاء المخاطي المعرض خلال الجماع تكون أكبر بكثير في النساء منها في الرجال ، كما أن سطح الغشاء المخاطي المبطن للمهبل يتمزق بسهولة أكثر (بالموازنة مع القضييب ) ويسهل اختراق الفيروس له ، والفتيات صغيرات السن أكثر عرضة من النسوة من الفئة العمرية 18 - 45 سنة لأن عنق الرحم يكون غير مكتمل النضج وإفراز المخاط المهبلي القليل لديهن يكونان حواجز أقل قوة ضد إختراق فيروس العوز المناعي البشري من مثيلاتهن لدى النساء الأكبر سناً ، و تحدث العدوى لدى النساء في سن أصغر من تلك التي يصاب فيها الرجال بالعدوى ، و ذلك يرجع جزئياً إلى أن كثيرات من النساء يتزوجن أو يمارسن الجنس مع رجال أكبر منهن سناً ممن يكون لهم من قبل عدد من القراء من النسوة ، و جزئياً بسبب التأثيرات البيولوجية لدى النساء .



## هل لابد أن يكون لك قرناء جنس متعددون لكي تصاب بعدوى فيروس العوز المناعي البشري و الأمراض المنقولة جنسياً ؟

إن اتصالاً واحداً فحسب مع شخص مصاب بعدوى فيروس العوز المناعي البشري يكفي لنقل العدوى ، و لكن الخطر يتزايد مع تعدد قرناء الجنس ، و مع تكرار العلاقة الجنسية . كذلك يزيد وجود مرض منقول جنسياً (مثل النقرحات الجنسية) لدى القرين من خطر نقل عدوى فيروس العوز المناعي البشري .

## أسئلة عن انتقال العدوى

(أ) هل ينتشر فيروس العوز المناعي البشري بواسطة البغايا وزيائتهن؟

إن البغايا وزيائتهن مثل أي أناس آخرين ممن لهم قرناء جنس كثيرون معرضون لخطر شديد من انتقال العدوى إليهن من زبون مصاب بها ، و هن بدورهن يقمن بنقلها إلى كثيرين آخرين .  
(ب) هل تكون المرأة في فترة المحيض معرضة لخطر أكبر لنقل عدوى فيروس العوز المناعي

البشري (الي قرينها)؟

يحتوي دم الحيض للمرأة المصابة بالعدوى على فيروس العوز المناعي البشري و يتوقف نقل العدوى على ما إذا كان هذا الدم اتصل بمجرى دم قرين الجنس ، كما أن المرأة أثناء الحيض تكون أكثر تعرضاً لخطر العدوى بفيروس العوز المناعي البشري .

و توجد هناك فرص ضئيلة جداً في أن تتم عملية نقل عارضة لدم يحتوي على فيروس العوز المناعي البشري و ذلك إذا كان المتبرع مصاباً بالعدوى و لكنه في الفترة النافذة ( حيث يكون الإختبار سلبياً ) عند التبرع ولا يمكن أن تصاب بالعدوى بفيروس العوز المناعي البشري إذا قمت بالتبرع بالدم .



(د) ماذا يحدث لطفل ولد لسيدة مصابه بعدوى فيروس العوز المناعي البشري؟

قد يولد الطفل مصاباً بالعدوى كما أن الأم يمكن أن تنقل إليه العدوى من خلال لبن الثدي أثناء الرضاعة بعد الولادة .

- خلال ٢٠ - ٤٠ % من الأطفال المولودين لأمهات مصابات بعدوى الفيروس تنتقل إليهم العدوى . و بعض هؤلاء سيصابون بالإيدز خلال العام الأول من العمر . و لن يحيا معظم الأطفال المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري حتى عيد ميلادهم الثاني ، و مع ذلك فبعضهم سيحيا ليبلغ من العمر سبع سنوات أو أكثر .

- لا جدوى من إجراء اختبار الكشف عن الأضداد للأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس العوز المناعي البشري حيث يوجد احتمال كبير بنتيجة ايجابية زائفة لوجود أضداد من دم الأم في الدورة الدموية للوليد .ولن يكون اختبار الأضداد للأطفال موثوقاً فيه قبل سن ١٨ شهراً أو بعده .

### (ه) هل ينتقل فيروس العوز المناعي البشري من خلال رضاعة الثدي؟

يحتوى لبن ثدي الأم المصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري على الفيروس الذي يمكن أن ينتقل إلى الطفل . و في الحالات التي يتوفر فيها لأطفال الأمهات المصابات بعدوى فيروس العوز المناعي البشري إتاحة غير منقطعة لبديل عن لبن الأم و يكون هذا البديل كاف من الناحية الغذائية فيتم تحضيره و إعطاؤه لهم في ظروف آمنة ، و بذلك تصيح فرصة خطر التعرض لعدوى الموت أقل لأنهم لم يرضعوا طبيعياً من امهاتهم .

أما إذا كانت الظروف صعبة التحقيق ، خاصة في البيئات التي تكون الأسباب الأساسية لوفيات الرضع و الأطفال هي الأمراض المعدية و سوء التغذية ، فإن الرضاعة الصناعية تزيد من خطر التعرض للمرض و الموت لدى الأطفال . و يجب إبلاغ الأمهات المصابات بالعدوى بالحقائق كاملة و إعطائهن الفرصة ليقررن ما هو المناسب لظروفهن ثم دعم إختيارهن . إن لبن الثدي هو أفضل غذاء للرضيع إذا ما كانت الأم غير مصابة بفيروس العوز المناعي البشري .



هل يمكن للإبر و السكاكين و غيرها من الأدوات أن تنقل فيروس العوز المناعي البشري ؟

نعم ، أي أداة يمكنها قطع الجلد أو إختراقه يمكن أن يتجمع عليها كميات صغيرة من الدم الذي يمكن أن ينتقل بدوره إلى شخص آخر إذا استعمل نفس الأداة قبل تعقيمها . تجنب الوشم ، و ثقوب الأذن و الوخز الإبري و الشفرات ما لم تكن متأكداً تماماً من أن الأدوات المستعملة لذلك قد تم تعقيمها أو غليها في الماء .



لا يوجد لهم أيبز . Aids . لا يوجد لهم أيبز . Aids . لا يوجد لهم أيبز . Aids . لا يوجد لهم أيبز .












## كيف يمكن للمرء أن يتعرف على شخص مصاب بعدوى فيروس العوز المناعي البشري ؟

- من المستحيل التعرف من المظهر الجسدي على ما إذا كان شخص ما مصاباً بعدوى فيروس العوز المناعي البشري لأن الفيروس قد يبقى كامناً في الجسم لعدة سنوات دون أن يحدث أي أعراض أو علامات .
- يمكن فقط لاختبار الدم - بعد فترة النافذة - أن يبين ما إذا كان شخص ما مصاباً بعدوى فيروس العوز المناعي البشري .



ماذا يحدث لو كنت تعيش بالقرب من مريض بالإيدز ؟

إن العيش قريباً من شخص مريض أو مصاب بعدوى فيروس العوز المناعي البشري لن يسبب لك العدوى ، و يمكنك العيش في سلام تام و في نفس الغرفة مع مريض الإيدز على أن لا يكون قريباً لك في الجنس و على أن تتخذ احتياطاتك في التعامل مع سوائل جسمه ( خاصة الدم ) .

## التهاب الكبد الفيروسي نوع (ب)

### تعريف التهاب الكبد :

- هو عبارة عن تلف في خلايا الكبد ناتج عن أمراض معدية و غير معدية في حالة التهاب الكبد الفيروسي ( ب ) يكون الإلتهاب ناتجاً عن وجود هذا الفيروس بالكبد .
- إذا اكتشفت أنك أو أحد أفراد أسرتك مصاب بهذا الفيروس فلا تدع اليأس يستولي على عقلك و ذلك للأسباب الآتية :
- ١- ليس كل مصاب بهذا الفيروس معرض لمضاعفات مثل الإلتهاب الكبدي المزمن أو التليف .
- ٢- المرض و إن حدث فهو بطيء في تطوره و هناك من عاش طوال حياته بدون أية مضاعفات ناتجة عن العدوى .
- ٣- لست وحدك في هذا العالم المصاب بهذا الفيروس ، حيث إن هناك الكثيرين مثلك و العلاج المتوفر ذو فاعلية معقولة و الأبحاث مستمرة لاكتشاف أدوية جديدة .
- ٤- أغلب المصابين بهذا الفيروس يعتبرون حاملين له فقط و ليس لديهم أية أعراض أو خلل بوظائف الكبد و مستوى نشاط الفيروس فيهم ضعيف أو غير موجود لذا فهم أشخاص سليمون و احتمال العدوى منهم لغيرهم ضعيف جدا و احتمال حدوث المضاعفات المستقبلية فيهم قليل أيضاً .









### ما هي أنواع العلاج المتوفرة ؟

العلاج المتفق عليه حالياً هو الانترفيرون (INTERFERON) الذي يعطى على هيئة حقن و نسبة نجاح العلاج تقدر بـ ٤٠% - ٣٠% أو باستعمال الحبوب (LAMIVUDINE ) يومياً هذه الأدوية ليست خالية من المضاعفات التي تكون بسيطة في أغلبها والعبارة كأعراض الزكام التي يسببها ( INTERFERON ) وتدوم لعدة أيام وتخففى .

عادة ما ينصح الطبيب بالتحليل الدوري لتحديد نسبة الفيروس في الدم خلال فترة العلاج والتي ينتظر اختفاؤها بعد نهاية العلاج مباشرة ، ولكن يجب إعادة نفس التحليل ٦ أشهر بعد نهاية العلاج لمعرفة مدى النجاح الدائم لهذا العلاج .

### الغذاء :

لا يوجد غذاء خاص به . بالنسبة للأشخاص الحاملين للفيروس فلا داعى لتغيير أى شىء فى أسلوب حياتهم مجرد احتياطاتهم كى يقللوا من خطر عدوى غيرهم .

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تليف كبدى مع وجود سائل بالبطن فعادة ما ينصح الطبيب بالإقلال من البروتينات وكمية السوائل التي يتناولها فى اليوم .

### الرياضة :

ينصح بها لكل الناس بطريقة مدروسة و تدريجية .

### الأدوية :

فى المراحل الأولى يمكن للشخص تناول الأدوية الموصوفة طبياً و المتداولة بدون وصفة أية مخاطر بالنسبة للمسكنات فينصح بعدم الإكثار من ( Panadol ) بحيث لا تتجاوز الجرعة اليومية 2 جرام فى جرعات متعددة .



### النباتات الطبية ( الأدوية النباتية )

بالرغم من كثرة الحديث عن مثل هذه الأدوية و فائدتها فى أمراض الكبد خاصة فى شبكة الإنترنت إلا أنه لم يتم بطريقة علمية التأكد من مدى فائدة هذه المستحضرات فى التهاب الكبد الفيروسي ، إضافة إلى أن بعضها كانت له علاقة ببعض المضاعفات المباشرة فى الكبد ، أما بالنسبة للعسل و على الرغم من إيماننا الدينى و العلمى بفائدته فى الشفاء من بعض الأمراض إلا أنه لا توجد حتى الآن أية دراسة تثبت دوره فى هذا المرض ، لذا ينصح بعدم الإفراط فى تناوله و خير الأمور الوسط .

### الدعم النفسى :

اتضح أن للدعم النفسى العائلى من خلال الفرق المتخصصة له دور كبير فى تفهم المريض لمرضه و خاصة إذا كان على اتصال مع غيره من المصابين بهذا المرض لأن تبادل الآراء له دور إيجابى فى مثل هذه الظروف .



**البيّن . Aids . البيّن . Aids . البيّن . Aids . البيّن**

<http://www.way2sunnah.net/books>

مكتبة شاملة

الطريق إلى السنة











## رسالة إليك أخی المصاب

لا تفقد الأمل لا تياس من رحمة الله داء دواء قد يتأخر ولكنه سيأتى بعون الله .

فهذه الجمعية لأجلك ولحماية حقوقك فتعاون معنا باتباع الإرشادات التالية .

- 1 - إن كنت تتعاطى المخدرات فأقلع عنها حتى لا تصيب أبرياء آخرين .
  - 2 - ابتعد عن الزنا حتى لا تنتقل العدوى لغيرك .
  - 3 - عند ترددك على عيادات الأسنان لا تخجل من تعريف الطبيب بالمرض لكي يتمكن من التعامل معك .
  - 4 - أختى المصابة تجنبى الحمل .
  - 5 - تابع حالتك الصحية فى المستشفيات المتخصصة .
  - 6 - عند ترددك أو دخولك المستشفى لأى سبب تحدث مع الطبيب عن حالتك ولا تخجل .
  - 7 - عند ترددك على الحلاق تذكر أنك مصاب وتصرف على هذا الأساس .
- ولأنك إنسان متحضر نشكرك على تعاونك معنا وندعوك لزيارتنا فنحن أصدقاؤك .